

Diabète sucré et TEP au ^{18}F -FDG

Françoise BAULIEU, Catherine MAZE, Yann VENEL



Enquête dans le grand ouest

Françoise BAULIEU

Enquête


- **Information demandée au médecin prescripteur de la TEP**
diabète?
DID ou DNID?
nom des hypoglycémiants?
- **Consignes pour le patient diabétique avant la TEP**
si DID
si DNID
- **Prise en charge du patient diabétique le jour de la TEP**
glycémie?
seuil annulation TEP?
si hyperglycémie et TEP?

Information demandée au médecin prescripteur de la TEP

- Diabète? **19/19**
- DID ou DNID? **17/19**
- Nom des insulines et hypoglycémiants oraux? **12/19**


Consignes pour le patient diabétique avant la TEP

I - si DID



Consignes pour le patient diabétique avant la TEP

II - si DNID



Prise en charge du patient diabétique le jour de la TEP

- Contrôle de la glycémie? **19/19**
- Seuil hyperglycémie acceptable ? **15/19**
 - 8,3 - 15 mM/L
 - 1,5 - 2,2 g/L
- Si la TEP est maintenue malgré l'hyperglycémie:
 - pas de retard de réalisation de l'examen TEP* : **9**
 - insuline rapide* : **4**
 - attente chute spontanée glycémie* : **6**

Diabète sucré et TEP-FDG

Recherche systématique du diabète avant la convocation du patient

mesure systématique de la glycémie avant l'injection de FDG

pas de consensus

sur la prise en charge du patient diabétique.....